











SAN®
AGROW

# BOTECTOR®

Keine Chance für Botrytis und Co.

Version November 2023


## SAN AGROW

SAN Agrow Holding GmbH
Industriestraße 21
3130 Herzogenburg
Austria

+43 2782 83300
sanagrow-at@san-group.com
www.san-agrow.com



**Verwenden Sie alle Pflanzenschutzmittel verantwortungsbewusst. Lesen Sie vor dem Gebrauch das Etikett und die Produktinformation. Bitte kontaktieren Sie SAN Agrow für Informationen bzgl. genehmigter Nutzungsbestimmungen in Ihrem Land.**


**LÖSUNGEN FÜR NACHHALTIGE PFLANZENGESUNDHEIT UND ERNÄHRUNG**

**Passion for Innovation**




# BOTECTOR®

## VORTEILE

- **Botector**® enthält die einzigartige Wirksubstanz *Aureobasidium pullulans*
- Effektiver Schutz bei allen Wetterbedingungen, auch bei extremer Feuchtigkeit oder Trockenheit, sowie Kälte oder Hitze
- Höchst wirksam gegen Botrytis
- Keine Rückstände
- Keine Pathogenresistenz
- Ideal für integrierten Pflanzenschutz (IPM)
- Bio- und biodynamische Landwirtschaft

## WIRKWEISE

*Aureobasidium pulluans*
*Botrytis* sp.




1. Verletzte Stellen an der Pflanzenoberfläche wie Mikrorisse werden sofort nach der Verwendung von **Botector**® von *Aureobasidium pullulans* besiedelt.
2. Die mikrofeinen Risse werden versiegelt.
3. Das Pathogen stirbt mangels Nährstoffen und Raum.

## VERTRÄGLICHKEIT

- **Botector®** ist mit vielen anderen Fungiziden und Düngemitteln verträglich. Für die Verträglichkeitsliste, den QR-Code weiter unten scannen.
- Bei Produkten, die nicht verträglich sind, einen Intervall von drei Tagen vor und 3 Tagen nach der Anwendung von **Botector**® einhalten.



Verträglichkeitsliste

www.san-agrow.com


## ANWENDUNGSEMPFEHLUNG:

| Pflanze | Krankheit | Dosierung | Verdünnung | Kulturstatus |
|---|---|---|---|---|
| Tomate, Aubergine | Botrytis | 0.5 – 1.0 kg/ha | 500 – 1000 L/ha | Ab der ersten Blüte |
| Kürbis, Gurke, Melone | Botrytis Sclerotinia | 0.5 – 1.0 kg/ha | 500 – 1000 L/ha | Ab dem ersten echten Blatt |
| Früchte der Brassica-Gruppe | Botrytis Sclerotinia | 0.5 – 1.0 kg/ha | 500 – 1000 L/ha | Ab dem ersten geöffneten echten Blatt |
| Fruchttragende Sträucher | Botrytis | 0.5 – 1.0 kg/ha | 600 – 1000 L/ha | Ab der ersten Blüte |
| Erdbeere | Botrytis | 0.7 – 1.0 kg/ha | 600 – 1000 L/ha | Ab der ersten Blüte |
| Trauben (Tafel und Wein) | Botrytis | 0.4 – 1.0 kg/ha | 400 – 1000 L/ha | Sobald 80 % der Blüten abgefallen sind |

* Pflanze und Krankheit, sowie Dosierung können je nach lokaler Registrierung variieren. Bitte beachten Sie das jeweilige Etikett.

## WIRKSAMKEIT

**Schweregrad des Botrytis-Befalls und Häufigkeit in Früchten 22 Tage nach der Ernte**




*Tomate var. Runner F1, Greece 2018*

Bei Anwendung 22 Tage vor der Ernte, zeigte **Botector**® zahlenmäßig bessere Wirksamkeit als ein aktueller konventioneller Marktstandard.

**Botector**® verbessert die Haltbarkeit von Früchten.

www.san-agrow.com

Scannen Sie nebenstehenden QR-Code für mehr Informationen über **BOTECTOR**®.