SAN®
AGROW



# BOTECTOR®

Μην αφήνετε χώρο στο Βοτρύτη

Passion for Innovation




# BOTECTOR®

## ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


- Το **Botector**® περιέχει *Aureobasidium pullulans*
- Δοκιμασμένο σε ποικίλες κλιματολογικές συνθήκες (υψηλή υγρασία, ξηρασία) και σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών.
- Σημαντική και ανταγωνιστική λύση εναντίον του Βοτρύτη.
- Απαραίτητο εργαλείο για προγράμματα μηδενικών υπολειμμάτων.
- Χαμηλός κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.
- Ιδανικό εργαλείο σε προγράμματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (IPM).
- Πολύ καλή συμβατότητα με άλλα προϊόντα φυτοπροστασίας και λίπανσης.
- Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ) 2021/1165 και Καν. (ΕΕ) 2018/848, όπως κάθε φορά ισχύουν.

## ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ


*Aureobasidium pulluans*
*Botrytis* sp.




1. Οι μικρογρατζουνιές στην επιφάνεια του του φυτού παρέχουν ένα φυσικό σημείο εισόδου για τον Βοτρύτη. Αυτές οι πληγές αποικίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή του **Botector**®.




2. Η ταχεία αναπαραγωγή του *Aureobasidium pullulans* καταναλώνει τα διαθέσιμα θρεπτικά συστατικά και καταλαμβάνει το διαθέσιμο χώρο για την ανάπτυξη του Βοτρύτη




3. Η πληγή σφραγίζεται από το *Aureobasidium pullulans*, το οποίο δρα ως μια φυσική ασπίδα και αποτρέπει τον Βοτρύτη να μολύνει το φυτό.





## ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

- Το **Botector®** είναι συμβατό με πολλά φυτοπροστατευτικά σκευάσματα και λιπάσματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνδυαστικότητα του προϊόντος, απευθυνθείτε στους γεωπόνους της εταιρείας.
- Για την καταπολέμηση του Βοτρύτη, η χρήση άλλων μη συνδυαζόμενων μυκητοκτόνων σκευασμάτων πρέπει να απέχει 3 ημέρες από την εφαρμογή με το **Botector®**.



## ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

| Καλλιέργεια | Ασθένεια | Δοσολογία | Χρόνος εφαρμογής |
|---|---|---|---|
| **Τομάτα (Υ)** | Βοτρύτης | 50 – 100 γρ./στρ. | Από την άνθηση μέχρι και την πλήρη ωρίμανση των καρπών. BBCH 51-89 Μεγ. αριθμ. εφαρμογών: 5 |
| **Φράουλα (Υ)** | Βοτρύτης | 70 – 100 γρ./στρ. | Από την άνθηση μέχρι και την πλήρη ωρίμανση των καρπών. BBCH 61-89 Μεγ. αριθμ. εφαρμογών: 6 |
| **Αμπέλι** (Επιτραπέζιες και Οινοποιήσιμες ποικιλίες) | Βοτρύτης | 40 – 100 γρ./στρ. Στο Αμπέλι εφαρμόστε την ελάχιστη δόση (40 γρ./στρέμμα) για εφαρμογή μόνο σε σταφύλια. Εφαρμόστε τη μεγαλύτερη δόση (100 γρ./στρέμμα) για εφαρμογή σε όλο το πρέμνο. | Από την άνθηση μέχρι και την πλήρη ωρίμανση των ραγών. (Άνοιξη-Φθινόπωρο) BBCH 68-89 Μεγ. αριθμ. εφαρμογών: 4 |



Για περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν, σκανάρετε τον κωδικό QR δίπλα.



Κάτοχος της άδειας:


## SAN AGROW

SAN Agrow Holding GmbH
Industriestraße 21
3130 Herzogenburg
Αυστρία

+43 2782 83300
sanagrow-at@san-group.com
www.san-agrow.com


Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:


BIOGARD GREECE ΕΠΕ
Κέκροπος 62 & Κονίτσης 38,
151 25 Μαρούσι

Τηλ. 210 6460700
info@biogard.gr
www.biogard.gr


Version April 2023

*** Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.**

**ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΘΡΕΨΗ**