SAN®
AGROW



BOTECTOR®

Skuteczne rozwiązanie w zgodzie z naturą

Passion for Innovation




BOTECTOR®

ZALETY PRODUKTU


- **Botector**® zawiera wysoce skuteczną substancje aktywną *Aureobasidium pullulans*
- **Botector**® wykazuje wysoką ochronę podczas presji Szarej pleśni w każdych warunkach, w tym ekstremalnie mokrych, suchych, zimnych i gorących dniach
- Wysoce skuteczny przeciwko Szarej pleśni w uprawach jagodowych
- Brak pozostałości
- Brak rozwoju odporności
- Idealny do zintegrowanego zarządzania (IPM)
- Preparat biologiczny zalecany w uprawach ekologicznych jak również konwencjonalnych
- Kompatybilny z większością innych rozwiązań stosowanych w zwalczaniu Szarej pleśni w uprawach jagodowych

MECHANIZM DZIAŁANIA


Aureobasidium pulluans
Botrytis sp.



1. Mikro uszkodzenia na powierzchni owocu stanowią naturalne wrota patogenu. Miejsca są kolonizowane przez *Aureobasidium pullulans* natychmiast po zastosowaniu Botectora



2. Z powodu wysokiego tempa rozwoju *Aureobasidium pullulans*, patogen nie może zainfekować roślin



3. Mikro uszkodzenie jest całkowicie skolonizowane przez Aureobasidium pullulans. **Botector**® działa jak naturalna tarcza, która chroni przed infekcją Botrytis cinerea



Truskawka z zakażeniem Botrytis cinerea



Truskawka poddana działaniu **Botector**®

lista kompatybilności

www.san-agrow.com

SAN AGROW



ZALECENIA STOSOWANIA BOTECTORA W UPRAWACH JAGODOWYCH*:

RODZAJ UPRAW	Truskawka (w uprawie polowej i pod osłonami)*	Jeżyna, malina, morwa, borówka, żurawina, porzeczkoagrest, rokitnik, bez czarny, agrest, porzeczka biała, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, jarząb, głóg, róża z przeznaczeniem na jadalne owoce, róża z przeznaczeniem na jadalne kwiaty (w uprawie polowej i pod osłonami)	Winorośl (w uprawie polowej)
ZWALCZANE CHOROBY		Szara pleśń	
ZALECANA DAWKA DLA JEDNORAZOWEGO ZASTOSOWANIA	1,0 kg/ha	1,0 kg/ha	0,5-1,0 kg /ha
TERMIN STOSOWANIA	zapobiegawczo, od fazy ukazania się pąków kwiatowych na dnie rozety do końca fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 55-89)	zapobiegawczo od fazy początku rozwoju kwiatostanu do końca fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 51-89)	zapobiegawczo, od fazy kwitnienia do końca fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 6889)
ZALECANA ILOŚĆ WODY	500-2000 l/ha	1000 l/ha	800-1600 l/ha
MAKSYMALNA LICZBA ZABIEGÓW W SEZONIE WEGETACYJNYM	6 (odstęp między zabiegami: co najmniej 1 dzień)	6 (odstęp między zabiegami: co najmniej 1 dzień)	4 (odstęp między zabiegami: co najmniej 1 dzień)
KARENCJA	Nie stosować środka w dniu zbioru owoców.		

* Zalecenia stosowania w uprawach małoobszarowych



Version February 2023

SAN AGROW

SAN Agrow Holding GmbH
Industriestraße 21
3130 Herzogenburg
Austria

+43 2782 83300
sanagrow-at@san-group.com
www.san-agrow.com

Konsultacja techniczna
Dr Sławomir Doniec
+48 515 899 800

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

OCHRONA I ODŻYWIANIE ROŚLIN W HARMONII Z ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM