SAN®
AGROW



BOTECTOR®

Nedajte priestor botrytíde a iným

Passion for Innovation




BOTECTOR®

VÝHODY


- **Botector**® obsahuje *Aureobasidium pullulans*
- Účinná ochrana pre všetky podmienky, vrátane extrémneho mokra a sucha alebo chladu a horúčavy
- Vysoko účinný proti plesniam Botrytis a Sclerotinia
- Žiadne rezíduá
- Ideálny pre integrovanú ochranu proti škodcom (IPM) a organické poľnohospodárstvo
- Miešateľný s ďalšími prípravkami biologickej ochrany

SPÔSOB POUŽITIA


Aureobasidium pulluans
Botrytis sp.



1. Zraniteľné povrchové miesta ako mikroškrabance sú okamžite kolonizované kmeňom *Aureobasidium pullulans* po aplikácii **Botector**®.



2. Mikroškrabance sú zapečatené.



3. Patogén odumrie kvôli nedostatku živín a priestoru.

MIEŠATEĽNOSŤ

- **Botector**® je miešateľný s mnohými inými fungicídmi a hnojivami. Pre prístup na zoznam miešateľnosti použite kód QR nižšie.
- Pre nemiešateľné produkty udržujte minimálny interval troch dní pred a po aplikácii **Botector**®.



Zoznam miešateľnosti




DÁVKOVANIE APLIKÁCIÍ*:

Plodina	Choroba	Dávka	Objem zriedenej kultúry	
Slovensko				
Hrozno (stolové a vínové)	Botrytída	0.4 – 1.0 kg/ha	400 – 1000 L/ha	Od 80 % opadaných kvetov
Poľsko, Maďarsko, USA				
Paradajka, baklažán	Botrytída	0.5 – 1.0 kg/ha	500 – 1000 L/ha	Od prvého kvetu
Tekvica, uhorka, melón	Botrytis Sclerotinia	0.5 – 1.0 kg/ha	500 – 1000 L/ha	Od prvej skutočnej rastovej
Plodiny zo skupiny Brassica	Botrytis Sclerotinia	0.5 – 1.0 kg/ha	500 – 1000 L/ha	Od prvej otvorenej skutočnej rastovej
Ovocné kríky	Botrytída	0.5 – 1.0 kg/ha	600 – 1000 L/ha	Od prvého rozkvitnutého
Jahoda	Botrytída	0.7 – 1.0 kg/ha	600 – 1000 L/ha	Od prvého kvetu

* Odrody a choroby ako aj dávkovanie sa môžu líšiť podľa miestnych registrácií, pozrite si miestne označenie.

ÚČINNOSŤ

Závažnosť a výskyt botrytídy v ovocí hodnotené 22 dní po zbere úrody



Paradajka odroda Runner F1, Grécko 2018

Botector® preukázal numericky nadradenú účinnosť oproti štandardným chemikáliám, keď sa aplikoval 22 dní pred zberom úrody.

Botector® zlepšuje trvanlivosť ovocia.

Qenerika

www.san-agrow.com | www.qenerika.sk

Pre ďalšie informácie o **BOTECTOR®** si naskenujte kód QR.



SAN AGROW

SAN Agrow Holding GmbH
Industriestraße 21
3130 Herzogenburg
Rakúsko

+43 2782 83300
sanagrow-at@san-group.com
www.san-agrow.com

Qenerika s.r.o.
Nádražná 1489/58
900 28 Ivanka pri Dunaji
Slovensko
qenerika@qenerika.sk
www.qenerika.sk

Verzia január 2023

Všetky produkty na ochranu rastlín používajte zodpovedne. Pred použitím si prečítajte označenie a informácie o produkte. Informácie o autorizovaných podmienkach použitia vo vašej krajine si vyžiadajte od spoločnosti SAN Agrow.

RIEŠENIA PRE UDRŽATEĽNÉ ZDRAVIE A VÝŽIVU RASTLÍN